

Optimalizace

7. Spektrální rozklad a kvadratické funkce

Tomáš Kroupa Tomáš Werner
2021 LS

Fakulta elektrotechnická
ČVUT v Praze

Vlastní čísla a vlastní vektor

Nechť pro matici $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, nenulový vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$ a $\lambda \in \mathbb{C}$ platí

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}.$$

Pak λ je **vlastní číslo** matice \mathbf{A} a \mathbf{v} je **vlastní vektor** příslušný λ .

λ je vlastní číslo

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$$

\mathbf{v} je vlastní vektor

$$\mathbf{v} \in \text{null}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$$

Diagonalizovatelné matice

Definujme

$$\Lambda := \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \quad \text{a} \quad \mathbf{V} := [\mathbf{v}_1 \dots \mathbf{v}_n].$$

Potom $\mathbf{AV} = \mathbf{V}\Lambda$.

Matrice \mathbf{A} je **diagonalizovatelná** pokud je \mathbf{V} regulární.

Spektrální rozklad

Pro diagonalizovatelnou matici \mathbf{A} platí

$$\mathbf{A} = \mathbf{V}\Lambda\mathbf{V}^{-1} \quad \text{a} \quad \Lambda = \mathbf{V}^{-1}\mathbf{AV}.$$

Spektrální rozklad symetrické matice

Věta

Pro matici $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ jsou následující tvrzení ekvivalentní:

- \mathbf{A} je symetrická.
- Každé vlastní číslo matice \mathbf{A} je reálné a existuje ortonormální množina vlastních vektorů $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ matice \mathbf{A} .

Tedy pro reálnou symetrickou matici \mathbf{A} je matice $\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1 \dots \mathbf{v}_n]$ dokonce ortogonální a platí

$$\mathbf{A} = \mathbf{V}\Lambda\mathbf{V}^T = \lambda_1\mathbf{v}_1\mathbf{v}_1^T + \dots + \lambda_n\mathbf{v}_n\mathbf{v}_n^T.$$

$$\mathbf{A} = \mathbf{V}\Lambda\mathbf{V}^T$$

Interpretace

- Matice \mathbf{V} a \mathbf{V}^T jsou ortogonální
- Matice \mathbf{V} tak vyjadřuje např. rotaci a matice \mathbf{V}^T představuje rotaci v opačném směru

Obraz \mathbf{Ax} vektoru \mathbf{x} tak najdeme pomocí zrotovaného vektoru $\mathbf{V}^T\mathbf{x}$, na který aplikujeme škálování maticí Λ a opačnou rotaci \mathbf{V} ,

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{V}(\Lambda(\mathbf{V}^T\mathbf{x}))$$

Spektrální rozklad symetrické matice – interpretace (2)

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i^T$$

Interpretace

- Každý sčítanec $\mathbf{v}_i \mathbf{v}_i^T$ je (až na násobek λ_i) ortogonální projektor na přímku se směrovým vektorem \mathbf{v}_i ;
- Matice \mathbf{A} je tedy vážený součet ortogonálních projektorů na vzájemně kolmé přímky určené směry \mathbf{v}_i ;

Obraz \mathbf{Ax} vektoru \mathbf{x} tak najdeme jeho vyjádřením v ortonormální bázi $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ a škálováním pomocí vlastních čísel $\lambda_1, \dots, \lambda_n$,

$$\mathbf{Ax} = \sum_{i=1}^n \lambda_i (\mathbf{v}_i^T \mathbf{x}) \mathbf{v}_i$$

Pozitivní semidefinitnost

Matici $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ je pozitivně semidefinitní, pokud

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \geq 0 \quad \text{pro každý } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

Tvrzení

Pro symetrickou matici $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ jsou tato tvrzení ekvivalentní.

1. \mathbf{A} pozitivně semidefinitní.
2. Vlastní čísla matice \mathbf{A} jsou nezáporná.
3. Existuje matici $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ taková, že $\mathbf{A} = \mathbf{B}^T \mathbf{B}$.
4. Všechny hlavní minory matice \mathbf{A} jsou nezáporné.

Pozitivní definitnost

Matici $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ je pozitivně definitní, pokud

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0 \quad \text{pro každý } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}.$$

Tvrzení

Pro symetrickou matici $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ jsou tato tvrzení ekvivalentní.

1. \mathbf{A} pozitivně definitní.
2. Vlastní čísla matice \mathbf{A} jsou kladná.
3. Existuje regulární matice $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ taková, že $\mathbf{A} = \mathbf{B}^T \mathbf{B}$.
4. Všechny vůdčí hlavní minory matice \mathbf{A} jsou kladné.

Choleského rozklad

Věta

Nechť $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ je symetrická. Je-li \mathbf{A} pozitivně semidefinitní, potom existuje horní trojúhelníková matice $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tak, že

$$\mathbf{A} = \mathbf{R}^T \mathbf{R}.$$

Je-li \mathbf{A} pozitivně definitní, je taková matice \mathbf{R} jediná.

Aplikace pro symetrickou pozitivně definitní matici \mathbf{A} :

- Řešení soustavy $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$
- Invertování matice \mathbf{A}

Definitnost

Matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ je

- negativně semidefinitní, pokud $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \leq 0$ pro každé $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$,
- negativně definitní, pokud $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} < 0$ pro každé $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$,
- indefinitní, existuje-li $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ tak, že $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} < 0 < \mathbf{y}^T \mathbf{A} \mathbf{y}$.

Pozorování

\mathbf{A} je negativně definitní, právě když $-\mathbf{A}$ je pozitivně definitní.

Kvadratické formy

Kvadratická forma je homogenní polynom $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ stupně 2,

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j, \quad \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Poznámka

Pro každou kvadratickou formu $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ existuje symetrická matici $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ taková, že $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$.

Definitnost kvadratické formy f odpovídá definitnosti matice \mathbf{A} .

Extrémy kvadratické formy

Tvrzení


Uvažujme kvadratickou formu $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$, kde $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

- Je-li f pozitivně semidefinitní, pak má f v bodě $\mathbf{0}$ minimum.
- Je-li f pozitivně definitní, pak má f v bodě $\mathbf{0}$ ostré minimum.
- Je-li f indefinitní, pak f nemá minimum ani maximum.


Analogicky pro negativně semidefinitní matice/maximum.

Příklad: kvadratické formy s diagonální maticí pro $n = 2$


$$g(\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T \boldsymbol{\Lambda} \mathbf{y} = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$



$$g(\mathbf{y}) = y_1^2 + y_2^2$$
$$\boldsymbol{\Lambda} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$g(\mathbf{y}) = -y_1^2 - y_2^2$$
$$\boldsymbol{\Lambda} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$



$$g(\mathbf{y}) = y_1^2 - y_2^2$$
$$\boldsymbol{\Lambda} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Tvrzení


Pro každou kvadratickou formu f se symetrickou maticí \mathbf{A} existuje kvadratická forma g s diagonální maticí Λ tak, že $f(\mathbf{x}) = g(\mathbf{V}^T \mathbf{x})$, kde $\mathbf{A} = \mathbf{V} \Lambda \mathbf{V}^T$ je spektrální rozklad.

- Transformace $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{V}^T \mathbf{x}$ je rotace, reflexe nebo jejich složení
- Forma f má jednodušší popis v novém souřadném systému tvořeném ortonormální bází ze sloupců \mathbf{V}

Příklad: vrstevnice kvadratické formy pro $n = 2$

Elipsa

- Vrstevnice výšky 1 kvadratické formy $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ s pozitivně definitní maticí $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^2$ je pootočená elipsa
- Elipsa má osy ve směru vlastních vektorů \mathbf{v}_1 a \mathbf{v}_2
- Délky poloos elipsy jsou $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}$ a $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}}$



Kvadratická funkce

Kvadratická funkce je polynom $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ druhého stupně,

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{x} + c,$$

kde $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ je symetrická, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ a $c \in \mathbb{R}$.

Jak nalézt extrémy kvadratické funkce?

Má-li kvadratická funkce extrém, existují $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ a y_0 takové, že

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{x} + c = (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^T \mathbf{A} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + y_0.$$

Potom je f až na posunutí a konstantu kvadratická forma, o typu extrému v bodě \mathbf{x}_0 rozhodneme podle definitnosti matice \mathbf{A} .

Kvadrika je vrstevnice výšky 0 kvadratické funkce, tj. množina

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{x} + c = 0\}.$$

Speciální případy

- Elipsoid (\mathbf{A} je pozitivně definitní)
- Kuželosečka (pro $n = 2$)

Reference

-  T. Werner. *Optimalizace* (kapitola 6). Elektronická skripta. FEL ČVUT, 2020.
-  J. Velebil. *Abstraktní a konkrétní lineární algebra*. Elektronická skripta. FEL ČVUT, 2019.